

Farine de viande et d'os (10-5-1)									
Description	La farine de viande et d'os des Entreprise A. Jr. L inc. est naturelle à 100% car elles proviennent de source animal. La farine de viande et d'os plume facilite la croissance et le développement continu des plantes et plantules en comblant l'ensemble des besoins des cultures. L'azote, se libérant tout au long de la saison, permettra une croissance soutenue et le phosphore et le potassium aideront au développement racinaire et à la floraison. La farine s'applique bien en combinaison avec l'engrais coquille d'oeuf de monsieur Loïselle pour une fertilisation complète. Elle est approuvée en production biologique par Écocert.				Densité utilisée est celle de la farine de plumes: 16 kg/pi3 ou 565 kg/m3	60 ml=34 gr			
Culture		Moment application	Mode d'application	Dosage					75 ml/m2= 43 g/m2= 425 kg/ha
Annuelles/ Vivaces	Nouvelle plantation	Tôt au printemps quand les plantes commencent à pousser	Incorporer au sol en mélangeant bien avec le sol	75 ml/m2 (5 c. à table/10 pi2)	42N-21P-4K				
		Mi-Juin		75 ml/m2 (5 c. à table/10 pi2)	42N-21P-4K				
Bulbes	Nouveaux bulbes	À la plantation	Creuser un trou de 2-3 fois la dimension du bulbe, mélanger la farine avec la terre	30 ml (2 c. à soupe)	17N-8,5P-2K				
Arbres et arbustes	Arbre de 1ere année	Mi-juin	Creuser un trou suffisamment profond pour y déposer les racines.	75 ml/arbre (5 c. à table/arbre)					
			Mélanger le produit avec le sol		42N-21P-4K				
			Placer le plant, remplir le trou avec le mélange de terre/poudre d'os et arroser abondamment.						
	Arbres 2 ans+	Début mai	Mettre le produit autour de l'arbre, incorporer au sol et arroser	45 ml/arbre (3 c. à table/arbre)	25N-12,5P-2,5K				
		Fin mai		45 ml/arbre (3 c. à table/arbre)	25N-12,5P-2,5K				
		Fin juin		45 ml/arbre (3 c. à table/arbre)	25N-12,5P-2,5K				
Gazon	Implantation	À l'implantation	Avec un épandeur, incorporer au sol et semer le gazon	75 ml/m2 (5 c. à soupe/10 pi2)	42N-21P-4K				
	Entretien	Début mai	Appliquer en surface	2,5 kg/100 m2 (5,5 lbs/1000 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
		Mi juin		2,5 kg/100 m2 (5,5 lbs/1000 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
		Début août sauf si T plus grande que 30C		2,5 kg/100 m2 (5,5 lbs/1000 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
		Mi septembre		2,5 kg/100 m2 (5,5 lbs/1000 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
Légumes	Exigeants en azote (famille des choux/tomate/Poivron/Maïs/concombre/patate)	À la plantation	Incorporer au sol autour des plants en mélangeant bien.	45 ml/m2 (3 c. à table/10 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
		Mi juin		45 ml/m2 (3 c. à table/10 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
		Mi-juillet		45 ml/m2 (3 c. à table/10 pi2)	25N-12,5P-2,5K				
	Autres	Au semis ou la transplantation	Incorporer au sol en mélangeant bien.	75 ml/m2 (5 c. à soupe/10 pi2)	42N-21P-4K				
Rosiers	Nouvelle plantation	Tôt au printemps	Incorporer au sol en mélangeant bien avec le sol	60 ml/m2 (4 c. à table/10 pi2)	34N-17P-3K				
		Début juin		60 ml/m2 (4 c. à table/10 pi2)	34N-17P-3K				
Mise en garde et avertissement									
Bien se laver les mains après usage. Ne pas utiliser à moins de 3 mètres des lacs et des rivières. Garder fermé hermétiquement et entreposé dans un endroit sec.									
Analyse garantie									
N total : 10%									
Acide phosphorique total : 5%									

Potassium : 1%								
Calcium : 25%								
Finesse (passant à travers un tamis Tyler 100 mailles): 80%								